IX Estudio CinfaSalud: "Percepción y hábitos de los padres y madres españoles ante la pediculosis"

INCIDENCIA DE LOS PIOJOS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS ESPAÑOLES

SEÑALES DE ALERTA



69,7% Detecta la pediculosis por el picor en la cabeza de sus hijos.



63,4% Ve los piojos en el cabello.



4,7% Observa lesiones por picadura en el cuello o las orejas.

PERJUICIO PSICOLÓGICO







1 de cada **4** familias cree que tener piojos afecta emocionalmente a sus hijos.









2 de cada 5 padres/madres sienten que también les afecta a ellos.

PREOCUPACIONES



16,9% <-----Transmisión de enfermedades




TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN



9 de cada 10 familias aplican un tratamiento pediculicida para eliminar los piojos.



4 de cada 10 familias no utilizan repelentes de piojos.



Solo un **17**% realiza el tratamiento correctamente.

Sigue las instrucciones.



96,4%

Usa la lendrera.



76,9%

Revisa a los siete días y reaplica tratamiento si es necesario.



64,6%

Sique revisando con lendrera. 64,1%

No usa secador.



20,2%

FUENTES DE CONSULTA



MITOS Y FALSAS CREENCIAS

- Los piojos vuelan de una cabeza a otra.
- 🔀 Las mascotas los contagian.
- 🔀 Para eliminarlos hay que cortar el pelo.
- 🔀 Los piojos aparecen por falta de higiene.

Estudio realizado antes de la pandemia de covid-19.

















